

211-k. Pediatria**INSTRUÇÕES**

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, *tablet*, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

Conhecimento Específico**Legislação**

ASSINATURA DO CANDIDATO

X

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01 - Menino de 10 anos, portador de doença falciforme, dá entrada no pronto-socorro com história de febre há 3 dias, dor e aumento de volume em membro inferior direito na altura de protuberância tibial. Ao exame físico, apresenta-se taquipneico, gemente, taquicárdico, temperatura de 38°, fáscies de dor, hiperemia e edema de protuberância tibial direita, sem calor local. Saturação de oxigênio 89%. Qual das condutas abaixo NÃO ESTÁ INDICADA, na condução do caso?

- a) Antibiótico ev.
- b) Hiper-hidratação.
- c) Analgesia.
- d) Cintilografia ou ressonância magnética do membro afetado.
- e) Oxigenoterapia.

02 - Em relação a doenças malignas em crianças, assinale a alternativa correta.

- a) As dores são pauciarticulares, assimétricas, pode haver derrame articular e os exames hematológicos podem inicialmente estar normais.
- b) Neuroblastoma acomete preferencialmente crianças em idade escolar (acima de 6 anos).
- c) Osteossarcoma é o tumor ósseo maligno mais comum, acometendo preferencialmente ossos chatos.
- d) Mielograma somente está indicado se exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, não definirem o caso.
- e) Em relação a leucemias, o principal diagnóstico diferencial são as patologias reumatológicas, sendo moléstia reumática seu principal diagnóstico diferencial.

03 - Em relação às histiocitoses, considere as seguintes afirmativas:

1. A doença ocorre entre um e quatro anos de idade, com discreto predomínio do sexo masculino.
2. Segundo a Organização Mundial de Saúde, histiocitose maligna e sarcoma histiocítico estão relacionadas ao macrófago e histiocito.
3. Na histiocitose de células de Langerhans, as manifestações clínicas mais comuns são as lesões líticas ósseas.
4. Febre, astenia, linfonodomegalia, hepatosplenomegalia e lesões de pele são manifestações clínicas de histiocitose maligna.

Assinale alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

04 - Criança de 4 anos com história de dor abdominal em região de quadril e fossa ilíaca direita, febre há 2 semanas. Ao exame físico apresenta quadril direito em flexão e rotação lateral, com piora da dor quando faz rotação interna e extensão do mesmo quadril, com neuropatia do nervo femoral. Qual é a hipótese diagnóstica para o caso descrito?

- a) Osteomielite de cabeça de fêmur direito.
- b) Apendicite supurada.
- c) Artrite séptica de quadril direito.
- d) Psoíte piogênica.
- e) Sinovite transitória de quadril direito.

05 - Qual das alternativas abaixo apresenta CONTRAINDICAÇÃO para uso de anti-inflamatórios não hormonais, em caso de crianças com púrpura de Henoch-Schonlein?

- a) Invaginação intestinal/hipertensão arterial.
- b) Hipertensão arterial/sangramento gastrointestinal.
- c) Invaginação intestinal/sangramento gastrointestinal.
- d) Artrite migratória/glomerulonefrite.
- e) Sangramento gastrointestinal/glomerulonefrite.

06 - Qual das medicações abaixo NÃO demonstra benefício no tratamento de crianças com crise aguda de asma moderada?

- a) Brometo de ipratrópico.
- b) Corticoesteroides endovenosos.
- c) Betadrenérgicos endovenosos.
- d) Sulfato de magnésio endovenoso.
- e) Betadrenérgicos por via inalatória.

07 - Em relação à apneia obstrutiva do sono em crianças, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Hipertensão pulmonar, déficit de crescimento, enurese e baixa estatura são complicações que podem ocorrer.
- () Obesidade, prematuridade e doenças neuromusculares são fatores de risco para o evento.
- () Índice de apneia maior ou igual a cinco é considerado severo.
- () Pacientes com síndrome de Prader-Willi podem apresentar apneia por fraqueza muscular e doença pulmonar restritiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – V.
- b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – V.
- d) V – F – F – F.
- e) F – F – V – V.

08 - Em relação à hemossiderose pulmonar em crianças, considere as seguintes afirmativas:

1. Tríade diagnóstica é anemia ferropriva intratável, sintomas respiratórios e infiltrados difusos aos RX.
2. Contaminação da água por poluentes ambientais, não aleitamento materno e exposição a fumaça de cigarro são fatores de risco.
3. O diagnóstico é confirmado pela pesquisa de eosinófilos contendo hemossiderina no lavado gástrico ou alveolar.
4. Nefrectomia bilateral pode estar indicada nos casos de hemorragia pulmonar grave na forma associada à doença de Berger.

Assinale alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

09 - Segundo o IV Consenso Brasileiro de Asma, qual das condições abaixo NÃO caracteriza paciente de risco para crise de asma fatal ou quase fatal?

- a) Problemas psicossociais.
- b) Crise grave prévia com necessidade de suporte ventilatório ou internação em unidade de terapia intensiva.
- c) Asma lábil com provas de função pulmonar (pico expiratório forçado-PFE e volume expiratório forçado de 1 segundo-FEV1) abaixo de 30%.
- d) Cinco ou mais visitas à emergência ou três ou mais hospitalizações nos últimos doze meses.
- e) Necessidade do uso de corticoide sistêmico para profilaxia.

10 - Em relação aos acidentes loxoscélicos, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () O componente mais importante do veneno loxoscélico é a ação da enzima esfingomielinase D no endotélio vascular e hemácias.
- () A ação do veneno provoca colestase, com aumento de bilirrubina direta e mioglobinúria.
- () Dermatite de contato e prurigo estrófculo são diagnósticos diferenciais.
- () Deverá ser administrado corticoide nas formas cutâneas moderadas e graves se o acidente tiver acontecido há menos de 48 horas.

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F.
- b) V – F – V – V.
- c) F – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – V – V.

11 - Em relação à asma na infância, considere as seguintes afirmativas:

1. Um dos pais com asma e dermatite atópica são critérios maiores para seu diagnóstico.
2. Sibilância sem resfriado, eosinófilos no sangue periférico acima de 4% e diagnóstico médico de rinite são critérios menores para seu diagnóstico.
3. Exercício é o único precipitante natural da asma, que induz à taquifilaxia.
4. Corticoide oral em mais de 50% dos dias do ano é um critério de asma de difícil controle.

Assinale alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

12 - Em relação a intoxicações exógenas, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Acidose metabólica/cetonemia/convulsões. | () Salicilatos. |
| 2. Hipotensão/convulsão/tremores. | () Organofosforado. |
| 3. Crises oculógiras/distonia/opistotônico. | () Paracetamol. |
| 4. Miose/salivação/bradicardia. | () Fenotiazínicos. |
| 5. Náuseas/vômitos/encefalopatia hepática. | () Aminofilina. |

Assinale alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.
- b) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
- c) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.
- d) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
- e) 4 – 1 – 3 – 5 – 2.

13 - Menina de 4 anos, com tosse produtiva, febre há 6 dias, há 2 dias cansaço aos esforços e dor no mesmo hemitórax. Ao exame físico, taquipneica, temperatura de 39º, tiragem intercostal, subcostal, estertores finos em todo hemitórax direito, com diminuição de murmúrio vesicular e maciez à percussão de base de pulmão direito. Ecografia torácica evidencia derrame pleural à direita com septos, loculações e grumos. Qual dos tratamentos abaixo, caso não haja complicações, terá maior chance de sucesso sem necessidade de uma segunda intervenção e promoverá alta mais rápida dessa menina ao seu domicílio?

- a) Videotoracoscopia/antibióticos.
- b) Drenagem torácica fechada/antibióticos.
- c) Fibrinolíticos em cavidade pleural/antibióticos.
- d) Mínitoracotomia/fibrinolíticos.
- e) Decorticação pulmonar/fibrinolíticos.

14 - Em relação a alergias alimentares, assinale alternativa correta.

- a) Alérgenos alimentares são, na sua maior parte, representados por glicoproteínas lipossolúveis, não resistentes à ação de ácidos e proteases.
- b) Enteropatia e enterocolite induzidas por proteína alimentar são reações de hipersensibilidade mediadas por IgE.
- c) Alergia a nozes, amendoim e frutos do mar desaparecem geralmente na infância, enquanto que alergia a leite, soja e ovo podem ser mais duradouras.
- d) Intolerância à lactose é uma reação tóxica não imunomediada.
- e) As fórmulas à base de soja demonstram efeitos benéficos na prevenção primária de crianças com risco familiar de atopia.

15 - Em relação ao tratamento das alergias alimentares, considere as seguintes afirmativas:

1. Aplicação de adrenalina no vasto lateral da coxa determina absorção mais rápida e níveis séricos mais altos.
2. Após administração de adrenalina, paciente deverá ser colocado em posição prona, para diminuir progressão de alterações hemodinâmicas.
3. Os anti-histamínicos são considerados de segunda linha e nunca devem ser administrados isoladamente no tratamento da anafilaxia.
4. Os corticoesteroides sistêmicos devem ser usados nas doenças crônicas IgE mediadas, mistas ou doenças gastrointestinais não IgE mediadas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

16 - Qual das alternativas abaixo se mostra mais efetiva e segura na tentativa de redução do número de dias de uso de antibióticos em crianças com rinossinusite aguda bacteriana?

- a) Vasoconstrutores nasais.
- b) Corticoesteroides nasais.
- c) Lavagem de cavidades nasais com solução salina hipertônica.
- d) Anti-histamínicos sistêmicos.
- e) Inibidores de leucotrienos.

17 - Na glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, a hipertensão arterial está associada à retenção hídrica por diminuição de filtração glomerular e também:

- a) à lesão túbulo contornado proximal.
- b) ao hipoaldosteronismo primário.
- c) ao aumento da secreção de renina.
- d) ao aumento da reabsorção tubular de sódio.
- e) ao aumento da permeabilidade capilar.

18 - Criança de 5 anos, com pele seca, xeroftalmia, déficit ponderoestatural e manchas de Bitot. Qual hipovitaminose é responsável por esses achados?

- a) A.
- b) B1.
- c) B6.
- d) C.
- e) D.

19 - Menino de 5 anos internado há 3 dias com diagnóstico de broncopneumonia com derrame pleural. Medicado com penicilina, hidratação e oxigenoterapia. Apresenta oligúria, hipertensão arterial e edema bipalpebral. Parcial de urina com hematúria microscópica. Ureia = 122 mg/dl; creatinina = 4,2 mg/dl; hemograma com hemoglobina = 6 g% e plaquetas = 35.000 mm³. Qual é a principal hipótese diagnóstica para o caso?

- a) Insuficiência renal aguda pré-renal.
- b) Necrose tubular aguda.
- c) Síndrome hemolítico-urêmica.
- d) Glomerulonefrite pós-estreptocócica.
- e) Síndrome nefrótica com coagulação intravascular.

20 - Paciente de 6 anos, portador de síndrome nefrótica, é internado por edema generalizado, oligúria, sonolência e hipertensão arterial. Exames: albumina = 1,8 g/dl; creatinina = 1,0 mg/dl; Na = 138 meq/l; K = 4,2 meq/l; glicemias = 89 mg/dl; Ca = 7,8 mg/dl. Durante infusão de albumina, apresenta hipertonia de membros, tremores e espasticidade. Qual é a provável causa desses distúrbios?

- a) Hiponatremia.
- b) Hipertensão arterial.
- c) Hipernatremia.
- d) Hipomagnesemia.
- e) Hipocalcemia.

21 - Lactente de 36 dias é trazido ao pronto-atendimento com história de há 12 horas, febre de 39º, prostração e recusa alimentar. Ao exame físico: ativo; frequência cardíaca = 136; frequência respiratória = 38; ausculta cardíaca e pulmonar normais. A conduta que deve ser tomada é:

- a) antitérmico via oral, coleta de exames e retorno ambulatorial.
- b) internação, rotina de exames para investigar febre e iniciar antibiótico endovenoso.
- c) coleta para parcial de urina, urocultura e início de antibiótico por via oral.
- d) coleta para parcial de urina, urocultura e início de ceftriaxona intramuscular.
- e) internação, rotina de exames para investigar febre, aguardar resultados para análise; se houver evidência de infecção bacteriana, iniciar antibiótico endovenoso.

22 - Recém-nascido prematuro de 35 semanas, pequeno para a idade gestacional, filho de mãe portadora de doença de Graves, sem acompanhamento ou tratamento durante gestação. Qual condição abaixo, provavelmente, o recém-nascido apresentará?

- a) Bócio com TSH diminuído.
- b) Bócio com TSH aumentado.
- c) Bócio com TSH normal.
- d) Hipotireoidismo.
- e) Crise tireotóxica.

23 - Recém-nascido de termo, nascido de parto normal, com choro imediato, com 50 segundos de vida, apresenta cianose generalizada, frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto e frequência respiratória de 62 movimentos respiratórios por minuto. Após 30 segundos de administração de oxigênio inalatório, permanece com cianose. Qual a conduta a ser tomada nesse momento?

- a) Estímulos táticos e manter oxigênio inalado.
- b) Manter oxigênio inalado por mais um minuto.
- c) Intubação endotraqueal.
- d) Ventilação por pressão positiva com balão inflável.
- e) Ventilação com pressão positiva e naloxona.

24 - Escolar de oito anos, com tosse seca irritativa e febre há 20 dias, sem melhora com uso de amoxicilina, corticoide via oral e antitussígenos. Há quatro dias queixa-se de dor e formigamento em membros inferiores, com sensibilidade normal, dificuldade em deglutição sólidos e engasgos. Ao exame físico: diminuição de força muscular simétrica em membros inferiores, estertores finos em bases pulmonares, frequência respiratória de 18 movimentos respiratórios por minuto com diminuição difusa de expansibilidade torácica. Qual a conduta terapêutica a ser tomada?

- a) Corticoesteroides/amoxicilina.
- b) Imunoglobulina/azitromicina.
- c) Corticoesteroides/ceftriaxona.
- d) Corticoesteroides/imunoglobulina.
- e) Imunoglobulina/ceftriaxona.

*25 - Segundo escala de desenvolvimento sexual de Turner, a puberdade normal nos meninos é caracterizada por:

- a) G2 de Turner/testículo maior ou igual a 3 cm.
- b) G2 de Turner/testículo maior ou igual a 4 cm.
- c) G3 de Turner/testículo maior ou igual a 4 cm.
- d) G3 de Turner/testículo maior que 2 cm.
- e) G3 de Turner/testículo maior que 4 cm.

26 - Menino de 15 anos, portador de insuficiência mitral por sequela de moléstia reumática, vai ser submetido à extração dentária. Qual deve ser a profilaxia antimicrobiana indicada?

- a) Ceftriaxona.
- b) Eritromicina.
- c) Amoxicilina.
- d) Sulfametoxazol-trimetropin.
- e) Amoxiclavulonato.

27 - Em relação aos cálculos renais em crianças, considere as seguintes afirmativas:

1. Cálculos de oxalato e fosfato de cálcio são os mais comuns, sendo a hipercalciúria idiopática responsável pela maioria deles.
2. Cálculos de estruvita costumam estar associados a infecções urinárias com pH alcalino.
3. Recém-nascidos de baixo peso, que necessitem de suporte nutricional, podem desenvolver nefrocalcinoze por defeito de alcalinização de urina, levando a hipercalciúria e hipocitratúria.
4. Hidroclortiazida é o tratamento de eleição nos casos de hipercalciúria.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

28 - Menina de seis anos dá entrada ao serviço de emergência com queixa de dor, edema e hiperemia bipalpebral direita. Portadora de rinite alérgica com uso irregular de corticoide nasal, com queixas recorrentes de cefaleia e tosse noturna. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, afebril, hiperemia, edema bipalpebral direito. Qual conduta deve ser iniciada?

- a) Corticoesteroides e antibióticos via oral, com retorno em 48 horas.
- b) Antibioticoterapia via oral e retorno em 48 horas.
- c) Anti-histamínicos e antibiótico via oral, com retorno em 48 horas.
- d) Corticoesteroides via oral e lavagem ocular com solução salina gelada.
- e) Internação e antibioticoterapia endovenosa.

29 - Menina de quatro anos é atacada por seu cachorro em casa, com mordeduras nas pernas, mãos e pés. Animal vacinado e sadio. Qual esquema deve ser iniciado para profilaxia de raiva humana, além dos cuidados com ferimentos?

- a) Somente fazer vacinas se animal desaparecer ou se tornar raivoso.
- b) Iniciar esquema profilático com duas doses de vacina, uma no dia zero e outra no dia três.
- c) Iniciar esquema profilático com cinco doses de vacina nos dias zero, três, sete, dez e quatorze.
- d) Iniciar esquema profilático com duas doses de vacina, nos dias zero e três, e aplicar uma dose de soro.
- e) Iniciar imediatamente esquema com soro e cinco doses de vacina, nos dias zero, três, sete, quatorze e vinte e oito.

30 - Em relação à varicela e sua profilaxia, assinale alternativa correta.

- a) Imunoglobulina antivaricela zoster (ZIG), administrada a contatos domiciliares suscetíveis dentro de 72 horas de exposição, pode evitar manifestação clínica da doença.
- b) Imunoglobulina antivaricela zoster (ZIG), administrada antes de 96 horas de contágio, deve ser empregada em grávidas e recém-nascidos pré-termos abaixo de 32 semanas hospitalizados.
- c) Adolescentes com mais de treze anos, sem história anterior de varicela, devem receber dose única da vacina.
- d) Crianças com doenças leves, com ou sem febre, não devem receber a vacina.
- e) Imunidade materna protege recém-nascido contra a varicela.

* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

LEGISLAÇÃO

31 - Além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, são características que diferenciam os produtos, serviços e contratos sujeitos à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de outras atividades exclusivamente financeiras:

1. Oferecimento de rede credenciada ou referenciada.
2. Mecanismo de regulação.
3. Vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.
4. Restrição contratual, técnica ou operacional para cobertura de procedimentos solicitados por prestador de serviço pelo consumidor.

Estão corretos os itens:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 1, 3 e 4 apenas.
- d) 2 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

32 - No tocante à operação de planos de assistência à saúde sujeitos à fiscalização da agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
- () É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos vinculados à assistência à saúde de que trata a Lei 9.656/98.
- () É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro de assistência à saúde.
- () As entidades ou empresas de autogestão ou de administração que mantêm sistemas de assistência à saúde não se incluem entre as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da Lei 9.656/98.
- () As sociedades cooperativas incluem-se entre as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da Lei 9.656/98.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V – V.
- b) F – V – F – F – V.
- c) F – F – V – V – F.
- d) F – V – V – F – F.
- e) V – V – V – F – V.

33 - Sobre a cobertura assistencial obrigatória prevista na Lei 9.656/98, considere as seguintes situações:

1. Cobertura para tratamentos realizados no exterior, observadas as hipóteses taxativamente previstas pela Lei 9.656/98.
2. Cobertura nas doenças e lesões preexistentes à contratação dos produtos de assistência à saúde de que trata a Lei 9.656/98, independentemente de prazo ou condição.
3. Cobertura para procedimentos de inseminação artificial.
4. Cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessários, para o tratamento de mutilação provocada por técnica de tratamento de câncer.

Está/estão correto(s) o(s) item(ns):

- a) 2 apenas.
- b) 4 apenas.
- c) 1 e 3 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

34 - Sobre as exigências mínimas de cobertura a serem observadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, respeitadas as respectivas amplitudes definidas no plano-referência de que trata a Lei 9.656/98 nas segmentações ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, considere as seguintes afirmativas:

1. Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.
2. Cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como a exclusão dos procedimentos obstétricos quando o plano incluir internação hospitalar.
3. Cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos.
4. Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, quando incluir atendimento obstétrico.
5. Inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando-se os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

*35 - A respeito da gestão econômico-financeira das operadoras de planos privados de assistência à saúde e da responsabilidade dos seus administradores, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina da Lei 9.656/98 insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a noventa dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso, sendo vedada a alienação da carteira.
- () Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica.
- () Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
- () O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isso implique efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V.
- b) F – V – F – V.
- c) F – F – V – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – V – V – V.

36 - De acordo com o Código Civil (Lei 10.406/2002), as sociedades cooperativas possuem natureza jurídica de sociedades simples (CC, art. 982, § único), podendo-se dizer, contudo, quanto ao modo de constituição, de acordo com a Lei 5.764/71, que são sociedades:

- a) anônimas.
- b) de economia mista.
- c) de pessoas.
- d) mercantis.
- e) empresárias.

37 - De acordo com a Lei 5.764/71, são preceitos que se aplicam às sociedades cooperativas, EXCETO:

- a) a possibilidade de cessão de cotas-parte a não cooperados, desde que autorizada pelo conselho de administração.
- b) a possibilidade de definição de critérios de admissão por meio do Estatuto Social.
- c) o princípio da adesão voluntária, vedando-se a estipulação de número máximo de associados, salvo impossibilidade técnica.
- d) o princípio "one man, one vote", que confere ao cooperado a singularidade do voto, facultando-se, no âmbito daquelas que exerçam atividade de crédito, a opção pelo critério de proporcionalidade.
- e) a possibilidade de demissão do associado exclusivamente a seu pedido.

* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

38 - O Estatuto Social, além de atender às características próprias das sociedades cooperativas previstas no art. 4º da Lei 5.764/71, deverá consignar, ainda, outras disposições, de acordo com o art. 21 da mesma Lei. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO corresponde à exigência legal.

- a) Os casos de dissolução voluntária da sociedade.
- b) O modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade.
- c) O modo de reformar o estatuto.
- d) A forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade.
- e) As formalidades de convocação das assembleias gerais e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, permitindo-se o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular, limitada a sua participação nos debates.

39 - Quanto ao funcionamento das sociedades cooperativas e a relação entre elas e os associados, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O associado que aceitar estabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o cargo.
- b) A assembleia geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, sendo que suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
- c) Permite-se a representação do cooperado nas assembleias gerais por meio de mandatário com poderes especiais, sendo-lhe resguardado o direito de voto.
- d) Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou comerciais, que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições e salários.
- e) Não atendido o pedido administrativo, a convocação das assembleias gerais poderá ser feita pelos cooperados que representem 1/5 do quadro social, desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

40 - A respeito do Conselho Fiscal, órgão responsável pela fiscalização da administração da sociedade cooperativa, considere as seguintes afirmativas:

1. São inelegíveis os cooperados que possuam restrições perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA), bem como aqueles que possuam débitos pendentes junto aos órgãos da administração fazendária municipal, estadual ou federal.
2. É constituído por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, todos associados eleitos anualmente pela assembleia cooperativa geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 dos seus componentes.
3. Não podem fazer parte do conselho fiscal os parentes de diretores até o segundo grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau.
4. O associado não pode exercer, cumulativamente, cargos no órgão de administração e de fiscalização.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.