



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – HOSPITAL DE CLÍNICAS
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA

Edital n° 02/2015 – HC - Edital n° 02/2015 – HT

Prova Específica – 01/11/2015

112 – Psiquiatria

INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 50 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, *tablet*, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, *tablets*, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e /ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chaparia, tais como boné, chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o candidato será excluído do concurso.
12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Específica

INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

01 - Com relação aos sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes características:

- () Apatia, pobreza do discurso e incongruência ideo-afetiva.
- () Alucinações auditivas com vozes que comentam o comportamento do sujeito.
- () Sensação de que o pensamento do sujeito foi ativamente removido de sua mente.
- () Sentimentos do sujeito impostos por um agente externo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – V – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – V.

02 - Qual das drogas abaixo poderia ocasionar uma síndrome orgânica cerebral reversível com sintomas demência-like e eletroencefalograma lentificado?

- a) Carbamazepina.
- b) Valproato de sódio.
- c) Lamotrigina.
- d) Lítio.
- e) Olanzapina.

03 - Assinale a alternativa que contém o mecanismo de ação farmacológico antimanicaco comum ao lítio e valproato.

- a) Inibição da proteína cinase C – PKC.
- b) Bloqueio da atividade da enzima adenilato-ciclase.
- c) Bloqueio de receptores dopaminérgicos D2.
- d) Bloqueio de canais de sódio.
- e) Decréscimo da liberação de glutamato e aspartato.

04 - Com relação ao tratamento da fobia social, considere as seguintes afirmativas:

1. A moclobemida praticamente deixou de ser prescrita no tratamento da ansiedade social.
2. Os inibidores da monoaminoxidase irreversíveis, fenelzina e trancipromina, se mostraram eficazes na redução de sintomas de fobia social.
3. Os tricíclicos se mostraram eficazes sobretudo no subtipo generalizado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

05 - Com relação ao transtorno delirante persistente, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () É menos prevalente que a esquizofrenia e geralmente inicia-se mais cedo.
- () O subtipo celotípico muitas vezes leva a litígios conjugais.
- () Pode haver alucinações táteis e olfatórias desde que estejam relacionadas ao tema delirante.
- () O quadro pode cursar com delírios de conteúdo bizarro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – V.
- b) V – V – F – F.
- c) F – V – V – F.
- d) V – F – V – F.
- e) F – F – V – V.

06 - Qual a estimativa de pacientes que apresentam refratariedade ao tratamento da esquizofrenia?

- a) 30%.
- b) 50%.
- c) 40%.
- d) 15%.
- e) 60%.

07 - As alterações cerebrais mais comuns associadas à esquizofrenia são:

- a) Dilatação ventricular e atrofia cortical.
- b) Dilatação ventricular e atrofia cerebelar.
- c) Atrofia hipocampal e dos gânglios da base.
- d) Atrofia dos gânglios da base e hipocampal.
- e) Atrofia do giro do cíngulo e dos gânglios da base.

08 - Com relação ao tratamento da esquizofrenia, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os antipsicóticos representam o principal tratamento.
- b) Os antipsicóticos devem ser utilizados em combinação com métodos psicossociais tais como orientação familiar e/ou psicoterapia.
- c) A clozapina é o antipsicótico de escolha para a esquizofrenia refratária.
- d) Os antipsicóticos podem retardar a progressão da deterioração da doença.
- e) Os estudos com eletroconvulsoterapia têm evidenciado eficácia no tratamento de sintomas positivos persistentes.

09 - Com relação aos portadores de esquizofrenia na infância, é correto afirmar:

- a) Manifestam delírios e alucinações com alta incidência de convulsões.
- b) Apresentam retardo mental como patologia de base.
- c) Demonstram desconfiança e temores de que pessoas controlem os seus pensamentos.
- d) Relatam redução do sono e do apetite sintomas negativos da esquizofrenia na infância.
- e) Apresentam percepção distorcida da realidade antes dos 7 anos de idade.

10 - Com relação ao tratamento do transtorno do pânico, assinale a alternativa correta.

- a) A terapia cognitivo comportamental deve ser considerada como tratamento de primeira linha.
- b) Os benzodiazepínicos são contraindicados nos casos de depressão comórbida.
- c) Consensos de especialistas recomendam que a farmacoterapia deve durar pelo menos 6 meses.
- d) No tratamento com terapia cognitivo comportamental, a exposição é o componente menos eficaz.
- e) A esquiva agorafóbica é um fator associado à boa resposta ao tratamento.

11 - A identificação de uma síndrome demencial que cursa desde os estágios iniciais com sinais parkinsonianos, alucinações visuais e flutuações do nível de desempenho cognitivo sugere o diagnóstico de:

- a) Doença de Alzheimer familiar.
- b) Doença de Pick.
- c) Doença de Creutzfeldt-Jakob.
- d) Demência com corpúsculos de Lewy.
- e) Pseudodemência.

12 - Quais as comorbidades psiquiátricas mais frequentes com transtornos alimentares na infância e adolescência?

- a) Abuso de substâncias, transtorno de conduta e transtorno obsessivo-compulsivo.
- b) Transtornos afetivos, transtornos ansiosos e abuso de substâncias.
- c) Transtornos afetivos, transtornos de personalidade e transtornos ansiosos.
- d) Transtorno opositor-desafiador, fobia específica e transtornos afetivos.
- e) Fobia específica, abuso de substâncias, transtorno obsessivo-compulsivo.

13 - São sinais marcadores não maníacos de bipolaridade (TB), EXCETO:

- a) Virada maníaca com antidepressivos.
- b) Episódios depressivos de longo curso.
- c) História familiar de TB em parentes de primeiro grau.
- d) Idade do primeiro episódio depressivo abaixo dos 25 anos.
- e) Personalidade hipertímica de base.

14 - Com relação ao tratamento do transtorno bipolar do humor, assinale a alternativa correta.

- a) A lamotrigina é eficaz em quadros de manias disfóricas.
- b) O valproato tem eficácia antidepressiva comparada à do lítio.
- c) O aripiprazol tem eficácia antidepressiva.
- d) A carbamazepina tem eficácia na ciclagem rápida.
- e) Cerca de 45% dos pacientes em litioterapia desenvolvem hipotireoidismo subclínico.

15 - Com relação às alterações neuropsicológicas no transtorno bipolar (TB), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Há uma correlação positiva entre déficits cognitivos e o número de episódios ou internações.
- b) As disfunções frontoestriatais podem em parte explicar as dificuldades de adaptação psicossocial dos pacientes acometidos.
- c) As dificuldades em domínios cognitivos remitem após a estabilização clínica do quadro agudo.
- d) Os déficits encontrados se referem basicamente às funções executivas.
- e) Os portadores de TB apresentam perfis de alterações cognitivas mais leves do que os pacientes portadores de esquizofrenia.

16 - Com relação à depressão, considere as seguintes afirmativas:

1. A depressão melancólica caracteriza-se por humor não reativo a estímulos prazerosos e piora vespertina dos sintomas.
2. Evidências clínicas e laboratoriais sugerem que a depressão esteja associada a uma hiperativação do eixo hipotálalo-hipófise-adrenal.
3. A depressão sazonal ocorre predominantemente em mulheres e frequentemente apresenta sintomas atípicos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

17 - Com relação ao transtorno de pânico (TP), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A matéria cinzenta periaquedatal tem um papel relevante na etiopatogenia do TP.
- () O risco de ocorrência de TP em parentes de primeiro grau de pacientes com TP seria de 30%.
- () Em estudos populacionais, a associação de TP com agorafobia pode estar presente em 50% dos casos.
- () Os ataques de pânico se iniciam de maneira abrupta e atingem gravidade intensa em torno de 30 minutos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – F – F – V.
- e) F – V – V – F.

18 - Assinale a alternativa que contém uma droga ansiogênica.

- a) Aripiprazol.
- b) Gincobiloba.
- c) Lactato.
- d) Canabidiol.
- e) Abercanil.

19 - Substância psicoativa que NÃO tem potencial de causar ataques de pânico.

- a) Cannabis.
- b) Cocaína.
- c) Metanfetamina.
- d) D-cicloserina.
- e) Cafeína.

20 - Com relação às alterações da sensopercepção e suas situações, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Hiperpatia. | () Psicose tóxica. |
| 2. Ilusão. | () Fadiga grave. |
| 3. Tinnitus. | () Esquizofrenia. |
| 4. Sonorização do pensamento. | () Síndrome talâmica. |
| 5. Alucinação táctil. | () Alteração coclear. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 5 – 3 – 4 – 2 – 1.
- b) 5 – 2 – 4 – 1 – 3.
- c) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
- d) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

21 - Assinale a alternativa que apresenta o tipo de alucinação que se caracteriza pela visão de imagens com cores malformadas e breve duração, não modificadas por estímulos ambientais.

- a) Alucinação de deafferentação/ liberação neuronal.
- b) Alucinação ictal.
- c) Alucinação nas psicoses.
- d) Alucinação funcional.
- e) Alucinação de Cummings.

22 - Assinale a alternativa que corresponde ao quadro de alteração da linguagem que cursa com repetição automática e involuntária das últimas sílabas que o paciente pronunciou.

- a) Glossolalia.
- b) Paralalia.
- c) Logoclonia.
- d) Tartamudez.
- e) Mussitação.

23 - Assinale a alternativa correspondente ao quadro que cursa com delírio de negação de órgãos acompanhado por delírio de imortalidade e enormidade.

- a) Síndrome de Ekbom.
- b) Pseudologia fantástica.
- c) Mitomania.
- d) Síndrome de Cottard.
- e) Síndrome de Chomsky.

24 - Assinale a alternativa que corresponde ao aumento excessivo do desejo sexual no homem.

- a) Satírase.
- b) Gerontofilia.
- c) Poriomania.
- d) Ninfomania.
- e) Acrofilia.

25 - Com relação à síndrome de “Münchausen por procuração”, considere as seguintes afirmativas:

1. Em geral, as vítimas são crianças em idade escolar.
2. Os sintomas físicos mais comumente produzidos nas crianças são convulsões, sangramentos, apneias, vômitos.
3. Em geral, o perpetrador do quadro tem conhecimento de medicina.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

26 - Com relação à “depressão puerperal” (pós-parto), considere as seguintes afirmativas:

1. Frequentemente a depressão teve início na gestação.
2. Ocorre via de regra em multíparas.
3. O tratamento medicamentoso incisivo ou com eletrocunvulsoterapia estão indicados para estes casos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

27 - Com relação à “Depressão Bipolar”, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Costuma ser a apresentação inicial do transtorno bipolar.
- () O tratamento com antidepressivos e sem estabilizadores do humor pode agravar o prognóstico do quadro.
- () O início abrupto e término gradual do episódio depressivo são características sugestivas de bipolaridade na depressão.
- () A falta de resposta a 3 ensaios adequados com antidepressivos é sugestiva de bipolaridade na depressão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – F.

28 - Com relação aos marcadores periféricos – neurotrofinas e fatores inflamatórios – no transtorno bipolar, considere as seguintes afirmativas.

1. Em geral, a depressão está mais associada a estados inflamatórios seguida da mania.
2. Os estudos têm mostrado aumento de citocinas pró-inflamatórias, independente da fase do transtorno.
3. Os antidepressivos aumentam a produção de interleucina 10 (IL-10).

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

29 - Com relação às características clínicas da hipomania, estados mistos e estágios da mania, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hipomania. | () Fuga de ideias e raiva visíveis. |
| 2. Estágio I da mania. | () Pânico. |
| 3. Estágio II da mania. | () Maior risco de suicídio. |
| 4. Estágio III da mania. | () Predomínio de euforia. |
| 5. Estados mistos. | () Ausência de sintomas psicóticos. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- b) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
- c) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- d) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- e) 1 – 4 – 2 – 3 – 5.

30 - Com relação ao tratamento do transtorno bipolar (TB) com lítio, considere as seguintes afirmativas:

1. O lítio tem eficácia de 70 a 80% no tratamento da mania.
2. O lítio é considerado o melhor estabilizador do humor na profilaxia do TB tipo I com ciclagem rápida.
3. A nefropatia induzida por lítio ocorre em cerca de 30% dos pacientes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

31 - Com relação ao tratamento farmacológico do transtorno bipolar, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A carbamazepina é eficaz no tratamento de manias disfóricas.
- () A lamotrigina é eficaz como terapia de potencialização do lítio na depressão bipolar.
- () A risperidona tem eficácia antidepressiva comprovada.
- () A eficácia antidepressiva do valproato é comparada à do lítio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – F.

32 - Qual dos autores abaixo descreveu os subtipos de *delirium* com base no nível de consciência e comportamento psicomotor?

- a) Minkowski.
- b) Kraepelin.
- c) Thomas Sydenham.
- d) Lipowski.
- e) Thomas Willis.

33 - Com relação ao tratamento farmacológico do *delirium*, considere as seguintes afirmativas:

1. As medicações psiquiátricas não tratam as causas etiológicas subjacentes do *delirium*
2. Os benzodiazepínicos, exceto na síndrome da abstinência alcoólica, devem ser evitados por piorarem os sintomas de *delirium*.
3. A prometazina raramente é utilizada no tratamento do *delirium* por causa dos seus efeitos anticolinérgicos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

34 - Com relação à neuropatologia associada aos quadros de esquizofrenia, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) os seguintes itens:

- () Predomínio de dilatação ventricular e atrofia cortical.
 () Presença de gliose.
 () Aumento de densidade neuronal em áreas pré-frontais (9 e 46).
 () São frequentes a redução de volume cerebral total

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – F.

35 - Com relação ao tratamento farmacológico da “esquizofrenia super-refratária”, considere as seguintes afirmativas:

1. A adição de memantina ao tratamento com clozapina mostra-se útil em pacientes com esquizofrenia refratária.
2. A lamotrigina em combinação com a clozapina apresenta efeitos benéficos em sintomas negativos e positivos.
3. Recomenda-se a substituição da clozapina para pacientes super-refratários.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

36 - Com relação aos subtipos depressivos, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Depressão melancólica. | () Piora matutina. |
| 2. Depressão atípica. | () Resposta com fototerapia e antidepressivos. |
| 3. Depressão sazonal. | () Compõe 15 a 19% das depressões. |
| 4. Depressão puerperal. | () Associa-se ao transtorno bipolar em 90% dos casos. |
| 5. Depressão psicótica. | () Resposta negativa com tricíclicos e positiva com IMAOS. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- b) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
- c) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- d) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- e) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.

37 - Com relação aos quadros de fobia social, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A ansiedade de desempenho como escrever diante das pessoas é classificada como fobia social do tipo generalizada.
 () Grupos de mútua ajuda são eficazes para fóbicos sociais com abuso de álcool.
 () Pacientes acometidos apresentam, com frequência, níveis altos de cortisol matinal.
 () Prevalência varia de 2 a 12%.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – F.

38 - Com relação ao “transtorno dismórfico corporal” (TDC), considere as seguintes afirmativas:

1. Os homens com TDC tem maior foco de preocupação com formas do corpo e as mulheres com cabelos e genitais.
2. A extrema insatisfação com a imagem corporal é o sintoma nuclear do TDC.
3. O TDC compartilha a hereditariedade com TOC. 7% dos pacientes com TDC podem ter algum familiar de primeiro grau com TOC.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

39 - Com relação ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Estudos de neuroimagem apontam o envolvimento dos gânglios da base e do lobo frontal na etiologia do TOC.
- () É comum a sintomatologia mudar de conteúdo no decorrer da evolução do quadro.
- () A comorbidade associada mais prevalente ao TOC é o transtorno de tiques.
- () Pode associar-se à infecção estreptocócica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – F.

40 - Com relação ao transtorno de ansiedade generalizada (TAG), considere as seguintes afirmativas:

1. O neuropeptídeo Y (NPY) tem sido relacionado à ansiedade tanto em modelos animais quanto em humanos.
2. O estado prolongado de preocupação exagerada é considerado central para o conceito de TAG.
3. Estudos têm evidenciado uma diminuição da ocorrência de sintomas ansiosos com o envelhecimento.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

41 - Assinale a alternativa que se relaciona a um quadro de AIDS, associado a perdas cognitivas globais, sintomas afetivos em especial apatia, abulia, às vezes irritabilidade, depressão ou mania, mudanças da personalidade e lentificação psicomotora.

- a) Demência fronto-temporal.
- b) Síndrome amnésica.
- c) Demência subcortical.
- d) Síndrome orbito-frontal.
- e) Síndrome da convexidade frontal.

42 - Assinale a alternativa relacionada ao direcionamento pelo examinador do processo de invenção de produtos de imaginação para preencher um vazio de memória no paciente. (Por exemplo: perguntar ao paciente se ele consegue lembrar-se de um encontro que aconteceu há 2 anos que, na realidade, não aconteceu. O paciente, sem a intenção de enganar o entrevistador, completa as lacunas de memória do suposto encontro, descrevendo-o com criações imaginativas.)

- a) Confabulações induzidas.
- b) Lembrança obsessiva.
- c) Criptomnésia.
- d) Ecmnésia.
- e) Fabulações de embaraço.

43 - Com relação às “alterações do reconhecimento”, o quadro associado ao déficit de formação do percepção é:

- a) Astereognosia.
- b) Agnosia táctil.
- c) Prosopagnosia.
- d) Agnosia associativa.
- e) Anosognosia.

44 - Sobre a “síndrome de Capgras inversa”, assinale a alternativa correta.

- a) O sujeito acha que ele próprio é um impostor.
- b) O sujeito não reconhece pessoas próximas ou familiares.
- c) Falso reconhecimento delirante de uma pessoa estranha.
- d) O sujeito acredita na mudança radical de sua aparência física sem alteração do self psicológico.
- e) É sinônimo de síndrome de intermetamorfose.

45 - Qual das alternativas abaixo NÃO constitui uma das 4 etapas do processo volitivo?

- a) Fase de decisão propriamente dita.
- b) Fase de deliberação.
- c) Fase de desejo.
- d) Fase de execução.
- e) Fase de propósito.

46 - Um paciente alcoolista refere “reconheço que tenho bebido demais e creio que não posso me controlar sozinho”. Em que estágio de disposição para mudança (desenvolvidos por Prochaska e DiClemente) este paciente se encontra?

- a) Pré-ponderação.
- b) Ponderação.
- c) Determinação.
- d) Ação.
- e) Manutenção.

47 - Um paciente com níveis plasmáticos de álcool entre 0,6 e 0,8 mg% apresentaria que tipo de fenomenologia relacionada à intoxicação?

- a) Hipotermia.
- b) Diminuição da concentração.
- c) Ataxia.
- d) Incoordenação motora.
- e) Morte.

48 - Ao contrário do que acontece com a encefalopatia de Wernicke, o quadro clínico da síndrome de Korsakoff não reverte após a reposição de tiamina. Assinale a alternativa que contém a substância que pode produzir uma melhora discreta da memória recente nos pacientes portadores deste quadro:

- a) Clonidina.
- b) Memantina.
- c) Ginkgo biloba.
- d) Modafínila.
- e) D-serina.

49 - Um paciente de 24 anos, portador de esquizofrenia, em uso de risperidona 4 mg/dia, após 8 meses de estabilização clínica, passa a apresentar sintomas positivos. Assinale a alternativa que contenha um possível motivo de desestabilização clínica relacionada ao caso.

- a) Erro diagnóstico.
- b) Organicidade.
- c) Resistência farmacológica.
- d) Início de tabagismo.
- e) Tolerância farmacológica.

50 - Assinale a alternativa que apresenta uma complicaçāo médica relacionada ao transtorno da compulsão alimentar periódica.

- a) Comprometimento da função renal.
- b) Hipertensão arterial.
- c) Osteoporose.
- d) Ascite.
- e) Prolapso retal.